

뎅기열, 치쿤구니아, 지카 바이러스를 전파시키는 모기 통제에 대한 협조 요청



윙~



감염된 암컷 모기(이집트숲모기 또는 흰줄숲모기)는 단순히 가렵거나 성가신 것 외에도 뎅기열, 치쿤구니아, 지카 바이러스를 퍼뜨릴 수 있습니다. 이러한 모기에 물린 사람들은 뎅기열, 치쿤구니아, 지카 바이러스에 감염됩니다.

- 암컷 모기는 물이 고여 있는 곳의 가장자리에 수백 개의 알을 낳습니다. 이 알들은 문질러 없애지 않는 이상 접착제처럼 붙어 있습니다. 알이 물에 잠기면, 부화되어 약 1주일 후에 성충이 됩니다.
- 성충 모기는 실내외에서 서식합니다.
- 또한 주로 낮에 활동합니다.
- 일부 감염된 모기는 지역사회에 대규모로 전파되어 가정용 질병의 위험을 초래할 수 있습니다.



화초는 물에서 떨어진 흙에 듭니다.



수영장을 사용하지 않을 때는 물을 비워 둡니다.



페타이어를 재활용하여 비로부터 보호합니다.



고여 있는 물은 모두 비우고 버립니다.



일주일마다 한 번씩 꽃병 및 기타 용기를 닦아 모기 알을 제거합니다.

본인, 가족, 지역 사회를 모기로부터 보호하려면

1.

집안이나 집 주변의 고여 있는 물을 제거하십시오.

- 일주일에 한 번씩 타이어, 양동이, 화분, 장난감, 수영장, 새 물통, 꽃병, 쓰레기통 등에 담긴 물을 비워 닦고, 뒤집어 놓거나 뚜껑을 덮거나 버립니다. 집 안팎을 확인합니다.
- 물 보관 용기(양동이, 물탱크, 빗물받이통)를 확실하게 덮어서 모기들이 산란하지 못하도록 합니다.
- 용기 뚜껑이 없으면 성충 모기보다 작은 구멍이 있는 철망을 대신 사용합니다.

2.

정화조가 있는 경우, 다음 단계를 따르십시오.

- 균열이나 틈을 보수합니다. 열려 있는 통풍구 또는 배관을 덮습니다. 성충 모기보다 작은 구멍이 있는 철망을 이용합니다.

3.

모기가 집에 들어오지 않도록 하십시오.

- 창문과 문에 방충망을 설치합니다.
- 방충망의 구멍을 보수합니다.
- 가능한 경우 에어컨을 틀어 놓습니다.

4.

모기에 물리지 않도록 예방하십시오.

- 다음의 유효 성분 중 하나가 포함되어 있는 EPA(미국환경보호국) 등록 방충제를 사용합니다. EPA에 등록된 모든 방충제는 안전성과 효능이 입증되었습니다.

유효 성분 (유효 성분의 비율이 높으면 효과가 오래 지속됨)	브랜드 이름(예시*)
디트(DEET)	Off!, Cutter, Sawyer, Ultrathon
피카리딘(Picaridin, 또는 KBR 3023, Bayrepel, icaridin이라고도 함)	Cutter Advanced, Skin So Soft Bug Guard Plus, Autan (미국 외)
IR3535	Skin So Soft Bug Guard Plus Expedition, SkinSmart
레몬 유칼립투스 오일(OLE) 또는 파라-메탄-디올(PMD)	Repel
** 방충제 브랜드 이름은 참고용입니다. 미국 질병통제예방센터 및 보건복지부는 어떠한 브랜드 제품도 권장하거나 보증할 수 없습니다.	

- 선택한 제품 및 강도에 따라 몇 시간마다 방충제를 다시 분사합니다.
- 방충제를 피부에 직접 분사하지 마십시오.
- 자외선차단제를 사용하는 경우 먼저 자외선차단제를 바른 후 방충제를 분사합니다.
- 옷과 장비(부츠, 바지, 양말, 텐트 등)에 페메트린을 분사하거나, 페메트린이 처리된 옷과 장비를 구매합니다
 - 처리된 옷은 여러 번 세탁한 후에도 보호 기능이 남아 있습니다. 보호 기능이 얼마나 지속되는지 알아보려면 제품 정보를 확인하십시오.
 - 직접 분사하는 경우 제품 지침에 주의하여 따릅니다.
 - 의류용 페메트린 제품을 피부에 직접 분사하지 마십시오.
- 긴 소매 셔츠와 긴 바지를 착용합니다.



빗물받이통의 뚜껑을 확실히 닫습니다.



일주일에 한 번씩 분수나 새 물통에 고여 있는 물을 비웁니다.



정화조를 밀폐된 상태로 유지합니다.



창문과 문에 방충망을 설치하거나 기존 방충망을 보수합니다.

자세한 내용은 아래로 문의하십시오
www.cdc.gov/dengue, www.cdc.gov/chikungunya, www.cdc.gov/zika